

### **Příbalová informace: informace pro pacienta**

Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml roztok k rozprašování

Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml roztok k rozprašování

Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml roztok k rozprašování  
salbutamol

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento léčivý přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

**Název přípravku je následující:**

- Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml & 2,5 mg/2,5 ml & 5 mg/2,5 ml roztok k rozprašování.
- Ve zbytku této příbalové informace se přípravek nazývá Salbutamol Noridem.

**Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek Salbutamol Noridem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salbutamol Noridem používat
3. Jak se přípravek Salbutamol Noridem používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Salbutamol Noridem uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je přípravek Salbutamol Noridem a k čemu se používá**

Přípravek Salbutamol Noridem obsahuje léčivou látku zvanou salbutamol. Ten patří do skupiny léků, které rychle rozšiřují průdušky (bronchodilatancia).

- Léky rozšiřující průdušky (bronchodilatancia) pomáhají dýchacím cestám v plicích zůstat otevřené. Díky tomu se vzduch snadněji dostává dovnitř a ven.
- Pomáhají zmírnit svíravý pocit na hrudi, sípání a kašel.

**Přípravek Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml:** Tato nízká dávka je uzpůsobena pro použití u dětí a kojenců pouze k léčbě těžkých astmatických záchvatů, kdy je nutné vdechování vysokých dávek salbutamolu.

Přípravek Salbutamol Noridem se používá k léčbě dýchacích potíží u lidí s astmatem a jinými onemocněními hrudníku. Obvykle se podává lidem, kteří těmito stavy poměrně silně trpí. Přípravek Salbutamol Noridem se také podává k léčbě těžkých astmatických záchvatů. Přípravek Salbutamol Noridem je tekutina obsažená v ampuli. Tekutina se dává do přístroje zvaného rozprašovač (nebulizátor). Tento přístroj vytváří jemnou mlhu, kterou vdechujete přes obličejovou masku.

V závislosti na závažnosti astmatu Vám lékař může předepsat přípravek Salbutamol Noridem samostatně nebo jako doplněk k trvalé léčbě souběžně s jedním nebo dalšími léky, jako jsou inhalační kortikosteroidy.

## 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salbutamol Noridem používat

### Nepoužívejte přípravek Salbutamol Noridem:

- jestliže jste alergický(á) na salbutamol-sulfát (léčivou látku) nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).

### Upozornění a opatření

Pokud je astma aktivní (například máte časté příznaky nebo záchvaty, jako je dušnost, která ztěžuje mluvení, příjem potravy nebo spánek, kašel, sípání, pocit svírání na hrudi nebo omezuje fyzickou schopnost), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek Salbutamol Noridem používat. Máte o tom ihned informovat svého lékaře, který Vám může nasadit nebo zvýšit dávku léku na kontrolu astmatu, jako je inhalační (vdechovaný) kortikosteroid.

- Máte vysoký krevní tlak.
- Jste člověk mající cukrovku.
- Máte nadměrně aktivní štítnou žlázu.
- Máte v anamnéze srdeční problémy, jako je nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep, závažné srdeční selhání nebo bolest na hrudi (angina pectoris).
- Používáte jiný roztok k rozprašování, např. ipratropium-bromid, ujistěte se, že se Vám mlha nedostane do očí. Tomu lze zabránit použitím náustku místo obličejové masky nebo brýlí.
- Užíváte xantinové deriváty (např. theofylin) nebo steroidy k léčbě astmatu.
- Užíváte tablety napomáhající odvodňování organismu (diuretika), které se někdy používají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdeční choroby.
- Pokud jste užíval(a) jiné léky používané k uvolnění ucpaného nosu (např. efedrin nebo pseudoefedrin) nebo jiné léky používané k léčbě astmatu.

V souvislosti s vysokými terapeutickými dávkami salbutamolu byl hlášen stav, kdy dochází ke hromadění kyseliny mléčné v krvi, známý jako laktátová acidóza, hlavně u pacientů léčených pro akutní bronchospasmus, kdy jsou křečovitě stažené svaly ve stěnách průdušek (viz bod 3 a 4). Zvýšení hladiny kyseliny mléčné může vést k dušnosti a zrychlenému a prohloubenému dýchání, i když může dojít ke zlepšení sípání. Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud máte pocit, že lék nepůsobí tak dobře jako obvykle (např. potřebujete vyšší dávky, aby se Vám ulevilo od dýchacích potíží, nebo Vám inhalátor nepřináší úlevu po dobu alespoň 3 hodin) a potřebujete používat rozprašovač častěji, než Vám doporučil lékař.

Pokud používáte přípravek Salbutamol Noridem více než dvakrát týdně k léčbě příznaků astmatu, nepočítaje preventivní použití před cvičením, svědčí to o špatně kontrolovaném astmatu a může to zvýšit riziko závažných astmatických záchvatů (zhoršení astmatu), které mohou mít závažné komplikace a mohou být život ohrožující nebo dokonce smrtelné. Máte se co nejdříve obrátit na svého lékaře, aby přehodnotil léčbu astmatu.

Pokud denně užíváte lék proti zánětu plic, např. "vdechovaný kortikosteroid", je důležité v jeho pravidelném užívání pokračovat, i když se cítíte lépe.

Užívání salbutamolu může někdy způsobit snížení hladiny draslíku v krvi, zejména pokud současně užíváte některé další léky. Pokud u Vás existuje riziko, že k tomu dojde, může Vám lékař doporučit další vyšetření k důkladnější kontrole krve.

Pokud se dýchání nebo sípání zhorší bezprostředně po užití tohoto přípravku, okamžitě jej přestaňte používat a co nejdříve to sdělte svému lékaři.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Salbutamol Noridem**

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době jste používal(a) nebo které možná budete používat včetně léků bez lékařského předpisu. To se týká i rostlinných léčivých přípravků.

Zejména informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud užíváte:

- léky na nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep.
- jiné léky na astma.
- léky snižující hladinu glukózy v krvi (antidiabetika).

Nezapomeňte si vzít tyto léky s sebou, pokud půjdete do nemocnice.

### **Přípravek Salbutamol Noridem s jídlem a pitím**

Přípravek Salbutamol Noridem můžete používat kdykoli během dne, s jídlem nebo bez jídla.

### **Těhotenství, kojení a plodnost**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.

**Přípravek Salbutamol Noridem může být používán během těhotenství, pokud to lékař považuje za nezbytné.**

### **Sportovci**

Užívání salbutamolu může způsobit pozitivní výsledek u antidopingových kontrolních testů.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek Salbutamol Noridem pravděpodobně neovlivní schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje či stroje.

Během používání rozprašovače (nebulizátoru) nemáte řídit ani používat stroje, protože rozprašovač vytváří mlhu určenou k inhalaci.

### **Přípravek Salbutamol Noridem obsahuje sodík**

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné ampuli, což znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

## **3. Jak se přípravek Salbutamol Noridem používá**

Přípravek Salbutamol Noridem se má používat především podle potřeby než pravidelně.

Vždy užívejte tento přípravek přesně tak, jak Vám řekl lékař. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### **Používání tohoto léčivého přípravku**

- **Tekutinu nepodávejte injekčně ani nepolykejte.** Přípravek Salbutamol Noridem má být vdechován pouze za pomoci rozprašovače.
- **Nedovolte, aby se Vám tekutina nebo mlha produkovaná rozprašovačem dostala do očí.** K jejich ochraně můžete nosit brýle nebo ochranné brýle.
- Lékař, zdravotní sestra nebo lékárník Vám mají ukázat, jak lék používat.
- Jedna malá plastová nádoba (ampule) obsahuje určité množství tekutiny.
- Tekutina se dává do rozprašovače. Tím se vytvoří jemná mlha, kterou budete vdechovat přes obličejovou masku nebo náustek.
- Rozprašovač používejte v dobře větrané místnosti, protože část mlhy se uvolní do vzduchu a může být vdechnuta ostatními.

### **Dospělí, dospívající od 12 let a děti od 4 do 11 let.**

- Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg až čtyřikrát denně. V případě potřeby se zvyšuje na 5 mg až čtyřikrát denně.

– **Přípravek Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml:** Toto podání nízké dávky není vhodné pro léčbu dospělých, ale je vhodné pro děti a kojence.

**Kojenci a děti:** 50 až 150 mikrogramů salbutamolu/kg (tj. 0,1 až 0,3 ml/kg přípravku Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml ve formě mlhy (v nebulizované formě), aniž by se překročilo 5 mg salbutamolu ve formě mlhy pro batolata starší 18 měsíců až 2 let (tj. čtyři jednotlivé dávky přípravku Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml nebo jedna jednotlivá dávka přípravku Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml ve formě mlhy) a 2,5 mg salbutamolu pro kojence a batolata mladší 18 měsíců (tj. dvě jednotlivé dávky přípravku Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml nebo jedna jednotlivá dávka přípravku Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml ve formě mlhy).

### **Používání ampulí**

1. Ampule jsou zabaleny v neprůhledném ochranném vaku. Ochranný vak neotvírejte, dokud ampule nebudete potřebovat použít.
2. Otevřete ochranný vak. V jedné ruce držte proužek ampulí, druhou rukou držte poslední ampuli v řadě.
3. Otočte ampuli směrem dolů a od sebe.
4. Vraťte zbývající ampule do ochranného vaku. Napište datum likvidace na vak do vyhrazeného místa jako připomínku. Datum likvidace je 3 měsíce od data otevření ochranného vaku. Otevřený vak vraťte do krabičky.
5. Přidržte horní část právě vyjmuté ampule. Ampuli otevřete.
6. Vložte otevřený konec ampule do misky rozprašovače a pomalu ampuli stiskněte. Ujistěte se, že je celý obsah vyprázdněn do rozprašovače.
7. Sestavte rozprašovač a použijte jej podle návodu.

### **Naředění ampulí**

- **Neředěte obsah ampule, pokud Vám to neřekne lékař.**
- Pokud Vám lékař nařídil roztok naředit, vyprázdněte obsah ampule do misky rozprašovače.
- Přidejte množství sterilního fyziologického roztoku, které vám doporučil lékař.
- Nasad'te víčko na misku rozprašovače a jemně protřepejte, aby se obsah promíchal.

Pokud je nutné ředění, má být použit pouze sterilní fyziologický roztok.

Inhalace pomocí rozprašovače (nebulizace) nemá obecně přesáhnout 10 až 20 minut.

Technika používaná pacientem má být pravidelně ověřována.

### **Po použití**

Po nebulizaci je třeba nepoužitý roztok, který zůstal v nádržce zařízení, zlikvidovat.

Čištění a údržba zařízení se provede podle doporučení výrobce.

Jednorázové ampule (obaly) neobsahují žádné konzervační látky; mají být použity ihned po otevření.

Pro každou nebulizaci má být použita nová jednorázová ampule. Obsah částečně otevřených nebo poškozených jednorázových ampulí se nemá podávat.

### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Salbutamol Noridem, než jste měl(a)**

Pokud jste použil(a) více léku, než jste měl(a), porad'te se co nejdříve s lékařem.

Může dojít k následujícím účinkům:

- Vaše srdce bije rychleji než obvykle.
- máte třes.
- neklid.

Tyto účinky obvykle odezní během několika hodin.

### **Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Salbutamol Noridem**

- Pokud zapomenete na dávku, vezměte si ji, jakmile si na ni vzpomenete.
- Pokud je však čas na další dávku, vynechanou dávku vynechejte.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

#### **Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Salbutamol Noridem**

Nepřestávejte používat přípravek Salbutamol Noridem bez porady s lékařem.

#### **Jestliže si myslíte, že pro Vás tento přípravek není dostatečně účinný**

Pokud se Vám zdá, že Váš přípravek nepůsobí tak dobře jako obvykle, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. Vaše potíže na hrudi se mohou zhoršovat a možná budete potřebovat jiný lék. Neužívejte více přípravku Salbutamol Noridem, pokud Vám to neřekne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

#### **4. Možné nežádoucí účinky**

##### **Pokud se Vaše dýchací obtíže (sípání) zhorší bezprostředně po použití tohoto přípravku, okamžitě přestaňte přípravek používat a co nejdříve to sdělte svému lékaři.**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

##### **Alergické reakce (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob).**

Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte přípravek Salbutamol Noridem používat a ihned vyhledejte lékaře. Příznaky alergické reakce zahrnují: otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním, svědivou vyrážku, pocit na omdlení, závrat a kolaps.

Trpíte-li srdečním onemocněním, informujte svého lékaře nebo jděte OKAMŽITĚ na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice, pokud pociťte bolest na hrudi nebo jakékoli příznaky zhoršení srdečního onemocnění.

##### **Co nejdříve se obraťte na svého lékaře, pokud:**

- máte pocit, že srdce bije rychleji nebo silněji než obvykle (bušení srdce). To je obvykle neškodné a obvykle ustane poté, co jste lék nějakou dobu užíval(a).
- můžete mít pocit, že Váš srdeční tep je nerovnoměrný nebo srdce občas vynechá nebo přidá úder.

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob. Pokud se Vám některý z nich vyskytne, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. **Nepřestávejte tento přípravek používat, pokud Vám to není řečeno.**

##### **Laktátová acidóza (frekvence není známa)**

- zvýšená hladina kyseliny mléčné v krvi (projevuje se zrychleným dýcháním, dušností, i když pociťujete zlepšení sípání, pocitem chladu, bolestí žaludku, pocitem nevolnosti a zvracením). V takovém případě přerušete léčbu přípravkem Salbutamol Noridem a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, které se mohou vyskytnout i u tohoto přípravku:

##### **Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)**

- Třes končetin (nohou a rukou).
- Zvýšený tep srdce.
- Bolest hlavy.

##### **Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)**

- Podráždění úst a hrdla.

- Svalové křeče.

**Vzácné** (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

- Nízká hladina draslíku v krvi.
- Zvýšený průtok krve do končetin (periferní dilatace).

**Velmi vzácné** (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

- Pocit nervozity.
- Neklid.
- Porucha srdečního rytmu (arytmie).
- Stejně jako u jiných přípravků podávaných inhalací by se po vdechnutí přípravku mohl objevit kašel nebo zvýšené dýchací obtíže. V takovém případě léčbu přerušte a kontaktujte svého lékaře, aby zvážil jinou léčbu.

### **Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících**

U dětí byly navíc hlášeny velmi vzácné nežádoucí účinky psychiatrických poruch/poruch chování týkající se nervozity a neklidu a také svědění.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím webového formuláře [sukl.gov.cz/nezadouciucinky](http://sukl.gov.cz/nezadouciucinky)

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 49/48  
100 00 Praha 10  
e-mail: [farmakovigilance@sukl.gov.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.gov.cz)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Salbutamol Noridem uchovávat**

Tento léčivý přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte ampule v krabičce a vnějším vaku, aby byly chráněné před světlem.

Po otevření ochranného vaku:

- Poznamenejte si datum otevření.
- K tomuto datu připočtete 3 měsíce. To bude datum "zlikvidujte po".
- Datum "zlikvidujte po" napište do vyhrazeného místa na vaku.
- Nepoužívejte žádné nepoužité ampule, které z tohoto vaku zbyly po datu "zlikvidujte po", vraťte je lékárníkovi k likvidaci.

Pokud nebyl vak otevřen, nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce, štítcích a vaku za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Pokud Vám bylo řečeno, abyste přestal(a) tento léčivý přípravek používat, vraťte nepoužitý přípravek Salbutamol Noridem lékárníkovi, aby jej zlikvidoval.

Zlikvidujte všechny částečně použité otevřené nebo poškozené jednorázové ampule.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. Obsah balení a další informace

### Co přípravek Salbutamol Noridem obsahuje

- Léčivou látkou je salbutamol-sulfát. Jedna 2,5 ml ampule obsahuje 1,25 mg salbutamolu (ve formě salbutamol-sulfátu).
- Léčivou látkou je salbutamol-sulfát. Jedna 2,5 ml ampule obsahuje 2,5 mg salbutamolu (ve formě salbutamol-sulfátu).
- Léčivou látkou je salbutamol-sulfát. Jedna 2,5 ml ampule obsahuje 5 mg salbutamolu (ve formě salbutamol-sulfátu).
- Dalšími složkami jsou chlorid sodný, voda pro injekci a kyselina sírová (k úpravě pH).

### Jak přípravek Salbutamol Noridem vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml roztok k rozprašování je balen ve stripech po 5 nebo 6 ampulích, v závislosti na velikosti balení, zabalených do neprůhledného hliníkového ochranného vaku. Jedna krabička obsahuje 30 nebo 60 ampulí.

Přípravek Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml roztok k rozprašování je balen ve stripech po 5 nebo 6 ampulích, v závislosti na velikosti balení, zabalených do neprůhledného hliníkového ochranného vaku. Jedna krabička obsahuje 30 nebo 60 ampulí.

Přípravek Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml roztok k rozprašování je balen ve stripech po 5 nebo 6 ampulích, v závislosti na velikosti balení, zabalených do neprůhledného hliníkového ochranného vaku. Jedna krabička obsahuje 30 nebo 60 ampulí.

Na trh nemusí být uvedeny všechny velikosti balení.

### Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

#### Držitel rozhodnutí o registraci

Noridem Enterprises Limited, Makariou & Evagorou 1, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Kypr

#### Výrobce:

Demo S.A. Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens – Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Řecko

### Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Belgie	Salbutamol Noridem 1,25 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler
	Salbutamol Noridem 2,5 mg solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler
	Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml solution pour inhalation par nébuliseur / verneveloplossing / Lösung für einen Vernebler

Česká republika	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Dánsko	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Finsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml sumutinliuos Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml sumutinliuos Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml sumutinliuos
Francie	SALBUTAMOL NORIDEM 1,25 mg/2,5 ml Solution pour inhalation par nébuliseur SALBUTAMOL NORIDEM 2,5 mg/2,5 ml Solution pour inhalation par nébuliseur SALBUTAMOL NORIDEM 5,0 mg/2,5 ml Solution pour inhalation par nébuliseur
Ireland	Brodilaten 1.25 mg / 2.5 ml Nebuliser solution Brodilaten 2.5 mg / 2.5 ml Nebuliser solution Brodilaten 5.0 mg / 2.5 ml Nebuliser solution
Itálie	Salbutamolo Noridem Salbutamolo Noridem Salbutamolo Noridem
Kypr	Brodilaten 1,25 mg/2,5 ml Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 2,5 mg/2,5 ml Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 5,0 mg/2,5 ml Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
Mad'arsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml oldat porlasztásra Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml oldat porlasztásra Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml oldat porlasztásra
Německo	Salbutamol Noridem 1,25 mg Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 2,5 mg Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 5 mg Lösung für einen Vernebler
Nizozemsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml verneveloplossing Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml verneveloplossing Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml verneveloplossing
Norsko	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Polsko	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Portugalsko	Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem Salbutamol Noridem
Rakousko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler Salbutamol Noridem 5 mg/2,5 ml Lösung für einen Vernebler
Řecko	Brodilaten 1,25 mg / 2,5 ml Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 2,5 mg / 2,5 ml Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή Brodilaten 5,0 mg / 2,5 ml Διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
Rumunsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg soluție pentru nebulizator Salbutamol Noridem 2,5 mg soluție pentru nebulizator Salbutamol Noridem 5,0 mg soluție pentru nebulizator

Slovenská republika	Salbutamol Noridem 1,25mg/2,5ml
	Salbutamol Noridem 2,5mg/2,5ml
	Salbutamol Noridem 5,0mg/2,5ml
Španělsko	Salbutamol Noridem 1,25 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
	Salbutamol Noridem 2,5 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
	Salbutamol Noridem 5,0 mg/2,5 ml solución para inhalación por nebulizador
Švédsko	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem
	Salbutamol Noridem

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 2. 2026**