Project name	Infasource Neutral 32x90 ml CZ-PL
Format	148 x 210 mm
Packaging codes	TD513483 – ZPCK 43930638
Globe (SKU)	12400946
Recipe Symbol	DSHL003-1
Technical drawing	–
Specification nr.	N/A
Colour	Cyan / Magenta / Yellow / Black / P 280 C
Font	DIN Pro – Myriad Pro – Wagfont2
Min font size	7 pts – Height: 1,2 mm (E.U. Ready)
Production plant	BIESSENHOFEN
Colour Cap (Band. Tin)	N/A
Printer	JOHNEN DRUCK GmbH & Co KG
Pre-press	Diadeis Suisse S.A. – NAI – DO-21-E0069 – 18.02.2021 – MGol

Proof Z R 0

TEXTE & DESIGN

Approval date:

STAMP + signature

148 mm

210 mm

Výživové údaje / Wartość odżywcza	Jednotka / Jednostka	Na 100 ml	Na 90 ml
Energie / Wartość energetyczna	kJ kcal	418 100	376 90
Tuky / Tłuszcz (50 % kcal), z toho / w tym:	g	5,5	4,9
– nasycené mastné kyseliny / kwasy tłuszczowe nasycone	g	1,9	1,7
– mononenasycené mastné kyseliny / kwasy tłuszczowe jednonienasycone	g	2,0	1,8
– polynenasycené mastné kyseliny / kwasy tłuszczowe wielonienasycone	g	1,0	0,90
– kyselina α-linolenová / kwas α-linolenowy	mg	75	67
– kyselina dokosahexaenová (DHA) / DHA	mg	30	27
– kyselina linolová / kwas linolowy	mg	850	765
– kyselina arachidonová (ARA) / ARA	mg	30	27
Sacharidy / Węglowodany (40 % kcal), z toho / w tym:	g	10	9,0
– cukry	g	6,7	6,0
– laktóza / laktoza	g	6,4	5,8
Bílkoviny / Białko (10 % kcal)	g	2,6	2,3
L-arginin / L-arginina	mg	78	70
Sůl / Sól (= Na (g) x 2,5)	g	0,092	0,083

Minerální látky / Składniki mineralne	Jednotka / Jednostka	Na 100 ml	Na 90 ml
Sodík / Sód	mg	37	33
Draslík / Potas	mg	115	103
Chloridy / Chlorki	mg	83	75
Vápník / Wapń	mg	100	90
Fosfor	mg	60	54
Hořčík / Magnez	mg	11	9,9
Železo / Żelazo	mg	1,0	0,90
Zinek / Cynk	mg	1,1	0,99
Měď / Miedź	mg	0,080	0,072
Mangan	mg	0,019	0,017
Fluoridy / Fluorki	mg	<0,10	
Selen	µg	4,5	4,0
Chrom	µg	<10	
Molybden / Molibden	µg	<14	
Jód / Jod	µg	19	17

Vitamíny / Witaminy	Jednotka / Jednostka	Na 100 ml	Na 90 ml
A	µg	100	90
D	µg	2,5	2,2
E	mg	2,3	2,1
K	µg	8,9	8,0
C	mg	20	18
Thiamin / Tiamina	mg	0,14	0,13
Riboflavin / Ryboflawina	mg	0,21	0,19
Niacin (Niacin ekvivalent) / Niacyna (ekwiwalent niacyny)	mg (mg NE)	1,0 (1,8)	0,90 (1,6)
B6	mg	0,090	0,081
Kyselina listová (folát) Kwas foliowy (foliany)	µg (µg DFE)	17 (28)	15 (25)
B12	µg	0,34	0,31
Biotin / Biotyna	µg	2,8	2,5
Kyselina pantothenová / Kwas pantotenowy	mg	0,94	0,85

Další nutrienty / Inne	Jednotka / Jednostka	Na 100 ml	Na 90 ml
Taurin / Tauryna	mg	8,3	7,5
L-karnitin / L-karnityna	mg	1,8	1,6
Cholin / Cholina	mg	30	27
Inositol / Inozytol	mg	20	18

Osmolarita / Osmolarność:	336 mOsm/l
Obsah vody / Zawartość wody:	86 g/100 ml

NE = Niacin Ekvivalent / ekwiwalent niacyny DFE = Folát Ekvivalent / równoważnik folianów

CZ Složení:
pitná voda, částečně hydrolyzované bílkoviny mléčné syrovátky, rostlinné oleje (slunečnicový, strukturovaný palmový, kokosový, řepkový), maltodextrin, laktóza, minerální látky (vápenaté soli kyseliny fosforečné, chlorid draselný, hořečnaté soli kyseliny citronové, draselné soli kyseliny fosforečné, chlorid sodný, chlorid vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný), rybí olej (obsahuje DHA), regulátor kyselosti (E 330), olej z *Mortierella alpina* (obsahuje ARA), L-histidin, cholin-chlorid, vitamíny (C, E, kyselina pantothenová, niacin, thiamin, riboflavin, A, B6, B12, biotin, K, kyselina listová, D), inositol, L-arginin, taurin, L-karnitin.
Bez lepku. Ošetřeno UHT.

PL Składniki:
woda, częściowo hydrolizowane białko serwatkowe (z mleka), oleje roślinne (słonecznikowy, strukturyzowany olej palmowy, kokosowy, rzepakowy), maltodekstryna, laktoza (z mleka), składniki mineralne (fosforan wapnia, chlorek potasu, cytrynian magnezu, diwodorofosforan potasu, chlorek sodu, chlorek wapnia, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), olej rybi, regulator kwasowości (E330), olej z *Mortierella alpina*, L-histydyna, chlorek choliny, witaminy (C, E, kwas pantotenowy, niacyna, tiamina, ryboflawina, A, B6, B12, biotyna, K, kwas foliowy, D), inozytol, L-arginina, tauryna, L-karnityna.
Produkt bezglutenowy. Sterylizowany UHT.

CZ Nestlé Česko s.r.o.,
Mezi Vodami 2035/31,
143 20 Praha 4,
Česká republika
tel: 800 135 135
www.nestlehealthscience.cz

Minimální trvanlivost do / Číslo šarže: viz karton.

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ!

PL Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Wyprodukowano w Niemczech.

Najlepiej spożyć przed / numer partii: patrz na butelce.

22 PAP

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

32 x 90 ml e (2880 ml)

TD513483 – 43930638 – DSHL003-1

12

12

148 mm

210 mm

Nestlé HealthScience®

infasource®

CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely. Od narození.
Nutričně kompletní potravina pro řízenou dietní výživu při zvýšené potřebě energie u kojenců a malých dětí.

Pokyny k přípravě: Zkontrolujte datum trvanlivosti na láhvi. Pokud je láhev nějakým způsobem poškozena, nepoužívejte ji. Před použitím protřepejte.

Návod k přípravě: Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umyjte ruce. Zajistěte, aby veškeré vybavení ke krmení bylo sterilní.

Pro podávání ústy: Odstraňte plastové víčko a hliníkovou fólii. Nasaďte sterilní savičku.
Při použití kojenecké láhve:
1. Láhev, uzávěr a savičku řádně vymyjte, aby uvnitř nezůstaly zbytky výživy.
2. Vyvářejte po dobu 5 minut. Nádobu během vyváření ponechte až do vyjmutí láhve uzavřenou.
3. Přelijte požadované množství výživy do vyvařené láhve.
4. Infasource® láhev opětovně uzavřete, uchovejte v chladničce (< 5 °C) a zbývající výživu spotřebujte do 24 hodin.

Zkontrolujte teplotu, je-li to nutné, umístěte teplou lahvičku do teplé vody. Dávejte pozor, abyste neponořili savičku. Před krmením vždy ověřte vyhovující teplotu výživy. Neohřívejte v mikrovlnné troubě. Výrobek nepoužívejte opakovaně ani neředěte. Během krmení držte dítě vždy v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít ke vdechnutí výživy a zalknutí. Nedojedené porce zlikvidujte do 1 hodiny od podání.

Pro podávání sondou: Po otevření nebo přelití do sterilního uzavřeného systému podejte do 6 hodin. Pro udržení konstantního průtoku použijte enterální pumpu. Po otevření uzavřete víčkem, skladujte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin.

Doporučené použití: Požadovaný denní nutriční příjem výživy a tekutin musí být stanoven lékařem.

Důležité upozornění: Může být použit jako jediný zdroj výživy nebo jako doplněk stravy. INFASOURCE® je možné používat pouze pod dohledem lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinické výživy. Pro kojence a malé děti, u kterých lékař stanovil potřebu vysokého příjmu energie. Kojení je během prvních měsíců života dítěte nejlepší způsob výživy. Než se rozhodnete použít tuto výživu, poraďte se s lékařem.

Upozornění: Není určeno pro parenterální použití. Není vhodné pro pacienty s alergií na bílkovinu kravského mléka. Nesprávné skladování, manipulace, příprava a krmení mohou ohrozit zdraví dítěte. Dodržujte přesně návod k přípravě. Do výživy INFASOURCE® cokoliv nepřidávejte ani ji neřeďte, s výjimkou doporučení lékaře. Nemíchejte s léčivy.

Skladovací podmínky: Neotevřené uchovejte v suchu při pokojové teplotě.

Baleno v ochranné atmosféře.

PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, dla dzieci od urodzenia.
Dieta kompletna pod względem odżywczym. Do postępowania dietetycznego u niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym.

Sposób przygotowania: Najlepiej spożyć przed - sprawdź datę na butelce. Jeśli butelka jest uszkodzona nie używaj produktu. Wstrząśnij przed użyciem.

Sposób użycia: Umyj ręce przed przygotowywaniem produktu. Upewnij się, że sprzęt potrzebny do karmienia dziecka został wysterylizowany przed użyciem.

Żywienie doustne: Zdejmij plastikową nakrętkę i folię aluminiową. Natóż wysterylizowany smoczek.
Jeśli zdecydujesz się na przelanie produktu do butelki dziecka:
1. Umyj dokładnie butelkę, smoczek, nakrętkę, aż pozbędziesz się wszystkich pozostałości po mleku.
2. Gotuj butelkę, smoczek, nakrętkę przez pięć minut. Pozostaw pod przykryciem, aż do momentu użycia.
3. Przelej odpowiednią ilość produktu Infasource® do wygotowanej butelki.
4. Zamknij butelkę Infasource® z pozostałą częścią produktu, przechowuj w lodówce (< 5°C) i zużyj w ciągu 24 godzin.

Sprawdź temperaturę produktu, jeśli to konieczne ogrzej butelkę poprzez umieszczenie jej pionowo w ciepłej wodzie bez zanurzania smoczka. Sprawdź temperaturę produktu przed karmieniem dziecka. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej. Nie podawaj ponownie dziecku ani nie rozcieńczaj produktu. Zawsze trzymaj dziecko podczas karmienia butelką. Dziecko pozostawione bez opieki może się zadławić. Niewykorzystaną porcję wyrzuć w ciągu 1 godziny od karmienia.

Żywienie dojelitowe za pomocą sztucznego dostępu: Raz otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 godzin. W celu utrzymania stałego przepływu, zalecane jest stosowanie pompy do żywienia dojelitowego. Po otwarciu niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin.

Zalecane stosowanie: Wymagane całkowite dzienne spożycie składników odżywczych i płynów powinno być obliczone przez wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, lekarza lub dietetyka.

Ważna informacja: Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Do postępowania dietetycznego u niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. Nieprzeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.
Przed podjęciem decyzji o karmieniu dziecka Infasource® skonsultuj się z lekarzem.

Ważna informacja: Nieodpowiedni w przypadku alergii na białko mleka krowiego. Nieprawidłowe przechowywanie, przenoszenie, przygotowanie oraz karmienie może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia dziecka. Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania. Nie rozcieńczaj ani nie dodawaj innych produktów do Infasource®, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie dodawaj leków.

Warunki przechowywania: Zamknięte opakowanie przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Pakowany w atmosferze ochronnej.